

ESOFAGITE EOSINOFÍLICA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

DIAGNÓSTICO

CRITÉRIOS

- Quadro clínico compatível

- **Biópsia com inflamação com predomínio de eosinófilos, ≥ 15 eos por CGA**

- **Exclusão de outras causas de eosinofilia**

- Pelo menos 6 fragmentos de diferentes locais, focando áreas alteradas macroscopicamente.
- Recomenda-se biopsiar o **duodeno** e o **antro** na EDA inicial em todas as crianças e em adultos com anormalidades endoscópicas ou sintomas gástricos e/ou intestinais altos

Dellon ES et al. Am J Gastroenterol 2013
Lucendo, AJ et al. United European Gastroenterology J 2017.

ESOFAGITE EOSINOFÍLICA

PHARMACOLOGIC

Patient with confirmed EoE

CONSIDER ONE AMONG THESE THERAPEUTIC OPTIONS*

PPI THERAPY

SWALLOWED TOPIC STEROIDS

ELIMINATION DIET

Omeprazole or equivalent

20 – 40 mg 2x/daily

| Drug | Target population | Induction dosing (usually divided doses) | Maintenance dosing (usually divided doses) |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Fluticasone propionate ^{a,b} | Children ^d | 880-1760 mcg/day | 440-880 mcg/day |
| | Adults | 1760 mcg/day | 880–1760 mcg/day |
| Budesonide ^{b,c} | Children ^d | 1-2 mg/day | 1 mg/day |
| | Adults | 2-4 mg/day | 2 mg/day |