

## Uso de Repelentes para crianças entre 6 meses a 2 anos

- 1- Não é recomendado abaixo de seis meses,
- 2- em menores de 2 anos usar com cuidado e seguindo instruções do produto
- 3- nos ingredientes dos repelentes encontram-se substâncias tóxicas, podem levar a reações alérgicas,
- 4- Repelentes compostos por DEET, IR3535 ou Icaridin podem ser aplicados na pele exposta ou nas roupas e seu uso deve estar em conformidade com as instruções do rótulo:

-DEET: concentração 6% a 9%, ação de 2h.

Recomendado para crianças acima de dois anos.

-DEET: concentração 14%, ação de até 6h.

Recomendado para crianças acima de 12 anos.

-Icaridina: concentração 50%, ação de até 5h.

Recomendado para maiores de 12 anos.

-Icaridina: concentração 25% (extreme), ação de até 10h. Recomendado para maiores de 10 anos.

-Icaridina: concentração 25% (infantil), ação de até 10h. Recomendado para maiores de dois anos.

-IR3535: ação de até 4h. Recomendado para maiores de seis meses.

-Óleo de citronela: concentração 1,2%, ação de 2h. Recomendado para maiores de dois anos

## Elaboração

Equipe de Saúde da Criança do Centro de Saúde-Escola "Prof. Samuel B. Pessoa"

Departamento de Pediatria – FMUSP

Dra Jaqueline L. Sgroi

Dra Luciana H. Miranda Omori

Dra Maria Aparecida F Aranha

Dra Paulette C. Douek

Dra Vera DÁvila

Dra Viviane Mandarino Terra

Enfermeira Reneide R. Ramos

Psicologa Raquel Diaz Degenszajn

### Referência bibliográfica:


- Sociedade Brasileira de Pediatria
- <http://www.dengue.org.br>
- <http://portalsaude.saude.gov.br/>
- *Repelentes de insetos: recomendações para uso em crianças/ Rev Paul Pediatr 2009;27(1):81-9.*



## REPELENTE de insetos

### Uso na INFÂNCIA





### Como se prevenir de picadas de insetos

Podem ser usadas telas nas janelas e nas portas do quarto da criança, é o método mais inofensivo à saúde.

-Hoje existem telas com permetrina ( produto inseticida). São recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive para adultos, principalmente no combate a doenças transmitidas por mosquitos, como a malária.

-Usar mosquiteiros no berço e cama é o mais recomendado para crianças e adultos,

-Aparelhos de tomada que liberam inseticida podem ser ligados quando a criança não estiver no quarto porque podem ser prejudiciais à saúde. Podem ser ligados longe do berço ou da cama.

-os aparelhos ultrasonicos não apresentam comprovação de boa eficácia

-Velas de citronela também podem ser usadas, quando o bebê não estiver no quarto ( pouca eficácia)

-Se a criança for brincar ao ar livre, deve usar roupas finas, com mangas compridas, punhos fechados, cobrindo braços e pernas

### Alguns cuidados gerais importantes para o uso de REPELENTE em CRIANÇAS



1. Evite repelentes tópicos em crianças menores de dois meses de idade.
2. Procure na embalagem do produto a partir de que idade o produto pode ser usado,
3. Leia todo o rótulo antes de aplicar o produto e guarde-o para consulta ( pode ser necessário em casos de alergia),
4. Aplique o produto conforme instruções do fabricante, somente nas partes do corpo permitidas,
5. Mantenha os repelentes fora do alcance de crianças, longe de alimentos, e não permita que apliquem sozinhas,
6. Não use próximo das mucosas (boca, nariz, olhos, genitais),
7. não usar em pele irritada ou ferida,

8. ao aplicar na face, primeiro aplique o produto nas mãos e depois espalhe no rosto com cuidado,
9. Sempre lave as suas mãos após aplicação de qualquer tipo de repelente.
10. Evitar aplicar nas mãos das crianças, elas constantemente colocam as mãos na boca, lave-as se ocorrer o contato,
11. Usar quantidade suficiente, reaplicar quando for indicado pelo fabricante,
12. A opção de usar loção repelente no lado externo da roupa da criança, deve ser cuidadosa, a criança pode colocar na boca.
13. A criança não deve dormir com repelente no corpo,
14. evite usar em conjunto com protetores solares, pois diminui a eficácia,
15. No caso de qualquer reação alérgica ou intoxicação, lave a área onde o repelente foi aplicado, entre em contato com serviço de controle de intoxicações ou um posto médico. Leve consigo a embalagem do repelente.